

## Golytely / Gavilyte-G Instrucciones

### IMPORTANTE:

- STOP La fenteramina y otros medicamentos para bajar de peso (incluyendo inyecciones como Wegovy, Ozempic y Mounjaro) 1 semana antes de su procedimiento.
- STOP tabletas de hierro 1 semana antes de su procedimiento.
- Debe notificar a la oficina de todos los medicamentos recetados que está tomando. Los pacientes con diabetes o enfermedad cardíaca pueden necesitar instrucciones específicas.
- Es fundamental que notifique a nuestra oficina lo antes posible si toma anticoagulantes como **Aspirina, Plavix, Coumadin (warfarina), Effient, Pradaxa, Eliquis o Brilinta.**

**El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la reprogramación de su procedimiento.**

### RECORDAR:

- NO COMA: Frutas crudas, nueces, verduras o suplementos de fibra 3 días antes de su procedimiento.
- NO: Mastique chicle o coma caramelos duros el día de su procedimiento.
- NO fume (vapeo, tabaco, marihuana ni drogas ilícitas) el día de su procedimiento.

### DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

- Debe tomar solo **LÍQUIDOS CLAROS**, evitando los **LÍQUIDOS ROJOS O MORADOS**. Los líquidos claros incluyen jugos sin pulpa, agua, caldo, café negro, té negro y Gatorade.
- Puede comer gelatina, refrescos (7-Up, Sprite, Starry, Ginger Ale) y paletas heladas siempre que no sean de color rojo o morado.
- NO consuma alimentos sólidos, leche ni productos lácteos.

### INSTRUCCIONES DE GAVILITE

1. Este producto se puede utilizar con o sin uno de los paquetes de sabores que vienen con la botella.
  - a. Si agrega sabor, abra el paquete de sabor y vierta el contenido en la botella ANTES de reconstituirlo. Deseche los paquetes de sabores sin usar.
2. Agregue agua potable tibia a la línea superior de la botella. Tape la botella y agite para disolver el polvo. La solución mezclada será transparente e incolora. No agregue nada más, como saborizantes adicionales, a la solución.
  - a. Cuando esté reconstituida, mantenga la solución refrigerada.
  - b. La solución reconstituida debe utilizarse en un plazo de 48 horas. Deseche la porción no utilizada.
3. La primera defecación generalmente ocurre aproximadamente 1 hora después de comenzar a beber la preparación.
4. **A partir de las 6:00 p.m.**, beba 1 vaso (8 oz) cada 10 minutos hasta que se acabe la solución. Beber rápidamente cada porción es mejor que beber pequeñas cantidades continuamente.

### DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

- **No puede comer ni beber nada.**
- Si está tomando medicamentos para la presión arterial, convulsiones, ansiedad o dolor crónico, tómelo según las indicaciones con un pequeño sorbo de agua.
- NO tome pastillas para la diabetes.
- Si está tomando insulina, disminuya su dosis en 1/2 .
- Si experimenta vómitos, comuníquese con el consultorio o con el médico de guardia.
- Si usa inhaladores, tráigalos con usted al EndoCentre.

**\*\*Recordatorio\*\*** DEBE tener a alguien que lo lleve a casa, dado que recibirá medicamentos intravenosos que lo harán sentir somnoliento.

**Por favor, llámenos inmediatamente si tiene alguna pregunta o inquietud.**

Pikesville, MD 21208  
Teléfono: 410-602-7782

Glen Burnie, MD 21061  
Teléfono: 410-863-4899

Westminster, MD 21157  
Teléfono: 410-876-8332