

Instrucciones de Peg-3350

IMPORTANTE:

- STOP La fenteramina y otros medicamentos para bajar de peso (incluyendo inyecciones como Wegovy, Ozempic y Mounjaro) 1 semana antes de su procedimiento.
- STOP tabletas de hierro 1 semana antes de su procedimiento.
- Debe notificar a la oficina de todos los medicamentos recetados que está tomando. Los pacientes con diabetes o enfermedad cardíaca pueden necesitar instrucciones específicas.
- Es fundamental que notifique a nuestra oficina lo antes posible si toma anticoagulantes como **Aspirina, Plavix, Coumadin (warfarina), Effient, Pradaxa, Eliquis o Brilinta.**

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la reprogramación de su procedimiento.

RECORDAR:

- NO COMA: Frutas crudas, nueces, verduras o suplementos de fibra 3 días antes de su procedimiento.
- NO: Mastique chicle o coma caramelos duros el día de su procedimiento.
- NO fume (vapeo, tabaco, marihuana ni drogas ilícitas) el día de su procedimiento.

DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

- Debe tomar solo **LÍQUIDOS CLAROS**, evitando los **LÍQUIDOS ROJOS O MORADOS**. Los líquidos claros incluyen jugos sin pulpa, agua, caldo, café negro, té negro y Gatorade.
- Puede comer gelatina, refrescos (7-Up, Sprite, Starry, Ginger Ale) y paletas heladas siempre que no sean de color rojo o morado.
- NO consuma alimentos sólidos, leche ni productos lácteos.

INSTRUCCIONES PEG-3350

- Surta su receta para el laxante.
- Deberá comprar una caja pequeña de tabletas de Dulcolax de venta libre (solo necesitará 2 pastillas).
- **En cualquier momento después de las 12:00 p.m., el día antes de su procedimiento, puede comenzar su preparación.**
 - Tomar 2 comprimidos de Dulcolax con agua.
 - Comience a beber la mitad de la solución: 8 onzas, cada 20 minutos.
 - Si experimenta molestias severas o hinchazón, puede esperar más tiempo entre vasos, pero debe continuar bebiendo.
 - 2 horas después, comience a beber la mitad restante de la solución: 8 onzas, cada 10-15 minutos.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

- **No puede comer ni beber nada.**
- Si está tomando medicamentos para la presión arterial, convulsiones, ansiedad o dolor crónico, tómelo según las indicaciones con un pequeño sorbo de agua.
- NO tome pastillas para la diabetes.
- Si está tomando insulina, disminuya su dosis en 1/2 .
- Si experimenta vómitos, comuníquese con el consultorio o con el médico de guardia.
- Si usa inhaladores, tráigalos con usted al EndoCentre.

****Recordatorio**** DEBE tener a alguien que lo lleve a casa, dado que recibirá medicamentos intravenosos que lo harán sentir somnoliento.

Por favor, llámenos inmediatamente si tiene alguna pregunta o inquietud.

EndoCentro de Baltimore
1838 Greene Tree Road
Suite 180
Pikesville, MD 21208

EndoCentre en la estación de Quarterfield
7704 Camino de Quarterfield
Suite A
Glen Burnie, MD 21061

EndoCentro de Westminster
535 Viejo Westminster Pike
Suite 104
Westminster, MD 21157

Teléfono: 410-602-7782

Teléfono: 410-863-4899

Teléfono: 410-876-8332