

Instrucciones de SuPrep

IMPORTANTE:

- STOP La fenteramina y otros medicamentos para bajar de peso (incluyendo inyecciones como Wegovy, Ozempic y Mounjaro) 1 semana antes de su procedimiento.
- STOP tabletas de hierro 1 semana antes de su procedimiento.
- Debe notificar a la oficina de todos los medicamentos recetados que está tomando. Los pacientes con diabetes o enfermedad cardíaca pueden necesitar instrucciones específicas.
- Es fundamental que notifique a nuestra oficina lo antes posible si toma anticoagulantes como **Aspirina, Plavix, Coumadin (warfarina), Effient, Pradaxa, Eliquis o Brilinta.**

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la reprogramación de su procedimiento.

RECORDAR:

- NO COMA: Frutas crudas, nueces, verduras o suplementos de fibra 3 días antes de su procedimiento.
- NO: Mastique chicle o coma caramelos duros el día de su procedimiento.
- NO fume (vapeo, tabaco, marihuana ni drogas ilícitas) el día de su procedimiento.

DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

- Debe tomar solo **LÍQUIDOS CLAROS**, evitando los **LÍQUIDOS ROJOS O MORADOS**. Los líquidos claros incluyen jugos sin pulpa, agua, caldo, café negro, té negro y Gatorade.
- Puede comer gelatina, refrescos (7-Up, Sprite, Starry, Ginger Ale) y paletas heladas siempre que no sean de color rojo o morado.
- NO consuma alimentos sólidos, leche ni productos lácteos.

INSTRUCCIONES DE SuPrep

Se requieren dos botellas de 6 onzas para completar la preparación.

- 5:00 PM - Complete los pasos 1-4 usando una botella de 6 onzas
- 11:00 PM - Repita los pasos 1-4 con la otra botella de 6 onzas

PASOS

1. Vierta una botella de 6 onzas de líquido SUPREP en el recipiente para mezclar.
2. Agregue agua potable fría a la línea de 16 onzas en el recipiente y mezcle.
3. Bebe TODO el líquido del recipiente.
4. Debe beber dos recipientes más de 16 onzas de agua durante la próxima 1 hora.
 - Es posible que **NO** tenga nada más para beber después de que se haya acabado la solución de medianoche, a menos que se le indique lo contrario.
 - Si experimenta vómitos, comuníquese con el consultorio o con el médico de guardia.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

- **No puede comer ni beber nada.**
- Si está tomando medicamentos para la presión arterial, convulsiones, ansiedad o dolor crónico, tómelo según las indicaciones con un pequeño sorbo de agua.
- NO tome pastillas para la diabetes.
- Si está tomando insulina, disminuya su dosis en 1/2 .
- Si experimenta vómitos, comuníquese con el consultorio o con el médico de guardia.
- Si usa inhaladores, tráigalos con usted al EndoCentre.

****Recordatorio**** DEBE tener a alguien que lo lleve a casa, dado que recibirá medicamentos intravenosos que lo harán sentir somnoliento.

Por favor, llámenos inmediatamente si tiene alguna pregunta o inquietud.

Suite 180
Pikesville, MD 21208
Teléfono: 410-602-7782

Suite A
Glen Burnie, MD 21061
Teléfono: 410-863-4899

Suite 104
Westminster, MD 21157
Teléfono: 410-876-8332